

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Трициллина для лечения и профилактики воспалительных
заболеваний родовых путей у коров
(организация-производитель «ООО «НИК Асконт+», Московская область)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1. Трициллин (Tricyllinum) - лекарственный антибактериальный препарат для лечения и профилактики послеродового эндометрита и других заболеваний родовых путей бактериальной этиологии у коров.
 2. Трициллин в качестве действующих веществ в 1 г содержит бензилпенициллина натриевую соль - 70000 ЕД, стрептомицина сульфата - 80000 ЕД и стрептоцида - 0,83 г.
 3. По внешнему виду препарат представляет собой порошок белого цвета.
 4. Выпускают препарат расфасованным по 6 г и 40 г в ламинированных или двухслойных полиэтиленовых герметично запаянных пакетах и в полимерных флаконах, укупоренных натягиваемой крышкой или стеклянных флаконах, укупоренных резиновыми пробками, укрепленных алюминиевыми колпачками.
- Каждую потребительскую упаковку маркируют с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, способа применения и массы препарата в упаковке, названия и содержания действующих веществ, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписи «Для животных», обозначения ТУ, номера государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия и снабжают инструкцией по применению.
- Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 20°C. Срок годности при соблюдении условий хранения - 3 года со дня изготовления.
- По истечении срока годности Трициллин не должен применяться.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

5. Входящие в состав препарата компоненты, взаимоусиливая противомикробную активность друг друга, обеспечивают широкий спектр бактерицидного действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. эшерихий, сальмонелл, стафилококков, стрептококков и кампилобактерий.
- При внутриматочном введении препарат плохо всасывается и оказывает антибактериальное действие, в основном, в тканях матки. Выводится из организма главным образом с мочой в неизменной форме и в виде метаболитов у лактирующих животных - частично с молоком.
6. Трициллин по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.

7. Трициллин применяют для профилактики и лечения послеродового эндометрита и других воспалительных заболеваний бактериальной этиологии родовых путей у коров после оказания родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа, при осложненных родах и травмах родовых путей.
 8. Перед применением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.
- При задержании последа для профилактики и лечения послеродового эндометрита через 12-24 часа после отела Трициллин вводят коровам внутриматочно в дозе 2,5-3,0 г, а также под находящуюся во влагалище плаценту - в дозе 1,5 г. Обработку проводят каждые 48 часов до самопроизвольного отделения последа.
- После оперативного отделения последа для профилактики заболеваний родовых путей Трициллин вводят внутриматочно двукратно в дозе 1,5 - 3,0 г. при осложненных родах, травмах родовых путей после родовспоможения и кесарева сечения - однократно в дозе 1,5-3,0 г.
9. При применении Трициллина в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у коров не установлено.
 10. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к Трициллину и появлении аллергических реакций использование препарата прекращают.

11. Убой коров на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после последнего введения Трициллина. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Молоко, полученное во время лечения и в течение 6 суток после последнего введения Трициллина, запрещается использовать в пищевых целях; такое молоко может быть использовано после кипячения в корм животным.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.

12. При работе с Трициллином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

13 Трициллин следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана «ООО «НИК «Асконт+»

Организация-производитель: «ООО «НИК «Асконт+»»; 142279, Московская область, Серпуховский район, пгт Оболенск, корпус 2 ВЛГ.