Инструкция по применению препарата Габивит – SE

Габивит-Se (Gabivit-Se) - лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное для профилактики и лечения гиповитаминозов, нарушений минерального обмена и заболеваний сельскохозяйственных животных и собак, вызванных недостатком селена. Габивит-Se содержит в качестве действующих веществ жиро- и водорастворимые витамины, селенит натрия, микроэлементы, гидролизат белка(лактоальбумин), а также консервант нипагин и растворитель - воду для инъекций. Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. В 1 мл препарата содержится: витамина А - 50000 МЕ, витамина Дз - 25000 МЕ, витамина Е -4 мг, витамина В1 - 10 мг, витамина В2 - 0,04 мг, витамина В6 - 2 мг, витамина В12 - 0,01 мг, никотинамида - 5 мг; пантотеновой кислоты - 2 мг, инозитола - 2 мг, холина цитрата - 5 мг, кобальта хлорида - 0,02 мг, сульфата меди - 0,1 мг, сульфата цинка - 0,1 мг, сульфата марганца - 0,06 мг, селенита натрия (в пересчете на селен) - 0,15 мг, гидролизата белка лактоальбумина - 5 мг. По внешнему виду представляет собой опалесцирующий раствор от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

Назначение
Габивит-Se применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов, нарушений минерального обмена и заболеваний сельскохозяйственных животных и собак, вызванных недостатком селена.

Биологические свойства
Свойства лекарственного средства Габивит-Se определяются комплексом биологически активных веществ, входящих в его состав. Витамины участвуют в метаболизме в качестве катализаторов и необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма животного. Микроэлементы активизируют работу ферментной системы организма; селен предотвращает развитие беломышечной болезни молодняка, обладает антиоксидантными свойствами. Селен и витамин Е препятствуют накоплению токсических продуктов перекисного окисления липидов, повышают иммунитет животных. По степени воздействия на организм препарат относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим, эмбриотоксическим и тератогенным свойствами.

Дозировка и способ применения.
С профилактической целью: при стрессах, в период интенсивных нагрузок, высокой продуктивности, беременным животным, при нарушениях воспроизводительной функции, отставании молодняка в росте и развитии, в период вакцинации, дегельминтизации, выздоровления после перенесенных заболеваний - препарат вводят однократно в дозах, указанных в таблице. С лечебной целью - в тех же дозах двукратно с интервалом в 7 суток.

Вид животного	Возрастная и технологическая группа	Суточная доза, мл/гол
Крупный рогатый скот	взрослое поголовье	15-20
	молодняк (6-12 месячного возраста)	10-15
	телята до 6-месячного возраста	8
Свиньи	супоросные, лактирующие свиноматки и хряки	10-15
	свиньи на откорме	5
	ремонтный молодняк	8
	поросята-отъемыши	2-3
	поросята-сосуны	2
Овцы, козы	взрослое поголовье	8
	молодняк	5
	ягнята, козлята	2
Собаки	живая масса до 10 кг	0,5
	живая масса от 10 до 30 кг	1,0
	живая масса свыше 30 кг	3,0

При необходимости курс введения повторяют через 1 -2 месяца.
При назначении препарата с профилактической целью необходимо учитывать содержание селена и витаминов в кормах, входящих в состав рациона животных.

Противопоказания
Противопоказанием к применению может быть индивидуальная повышенная чувствительность животных к селену или избыточное содержание селена и витаминов в рационе животных.

Форма выпуска
Выпускают в виде стерильного раствора, расфасованного по 10, 15, 25, 30, 50, 100 мл в стеклянные флаконы или по 400 и 500 мл в бутылки из темного стекла соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Каждую упаковку маркируют с указанием: организации-производителя и ее адреса, названия и состава препарата, содержания действующих веществ, объема препарата в упаковке, номера

серии, назначения, способа применения и условий хранения, срока годности и даты изготовления, номера государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия, обозначения стандарта, надписей «Для животных», «Стерильно» и снабжают инструкцией по применению. Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 50 С до 25 0С. Срок годности препарата при указанных условиях хранения - 1 год со дня изготовления. Производитель ООО «НПК «АСКОНТ+».

Примечания
Сельскохозяйственным животным на откорме Габивит-Se следует применять не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого убоя. В случае вынужденного убоя ранее этого срока мясо животных на месте ведения препарата следует использовать для приготовления мясокостной муки. Молоко животных после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Побочные действия
Побочных явлений и осложнений при применении Габивит-Se в соответствии с инструкцией по применению не отмечено. В месте инъекции препарата может наблюдаться изменение окраски кожи, самопроизвольно исчезающее в течение 10-14 суток.