Инструкция по применению вакцины "МИКРОДЕРМ"

вакцина для лечения и профилактики микроспории и трихофитии у кошек, собак, пушных зверей, кроликов и нутрий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Вакцина "МИКРОДЕРМ" рекомендована для лечения и профилактики микроспории и трихофитии кошек, собак, пушных зверей, кроликов и нутрий.
1.2. Вакцина выпускается в сухом и жидком виде. Сухая вакцина представляет собой пористую массу серовато-желтого цвета.
1.3. Вакцину выпускают в герметически укупоренных инсулиновых или пенициллиновых флаконах и ампулах в расфасовке по 1, 5, 10 и 20 мл, закрытых резиновыми пробками и обкатанных алюминиевыми колпачками.
1.4. На каждом флаконе и ампуле должна быть этикетка с указанием: наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака, наименование препарата, объема препарата, номера серии, номера контроля, даты изготовления (месяц, год), количества профилактических доз, срока годности, условий хранения и обозначения ТУ.
1.5. Флаконы и ампулы с нарушенной укупоркой, без этикетки, содержащие посторонние примеси, хлопья, а также с наличием плесени и измененной консистенцией к применению не пригодны и подлежат обезвреживанию кипячением в течение одного часа.
1.6. Одна доза вакцины составляет 1 см 3.
1.7. Сухая вакцина пригодна для применения в течение 1-го года от даты изготовления. Жидкая вакцина пригодна для применения в течение 6-ти месяцев со дня изготовления, при условии их хранения в сухом помещении при температуре 2-10 0С.
1.8. Перед применением сухую вакцину разводят из расчета 1 мл разбавителя на одну дозу вакцины, в качестве растворителя применяют стерильный физиологический раствор или дистиллированную воду. Для этого стерильным шприцем с иглой набирают разбавитель и с соблюдением правил асептики вводят во флакон или в ампулу с вакциной, при встряхивании сухая вакцина ресуспензируется, образуя равномерную взвесь, которую тем же шприцем вводят животному. Вакцина должна быть использована в течение 2-х часов после разбавления. Жидкую вакцину перед применением встряхивают.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ

2.1. Разрешается проводить прививки строго по назначению и под наблюдением ветеринарного врача. Перед вакцинацией каждое животное должно быть клинически осмотрено.
2.2. Не рекомендуется прививать животных с повышенной температурой тела,

во второй половине беременности, а также при наличии среди них больных острыми инфекционными заболеваниями (чума, инфекционный энтерит, гепатит, панлейкопения кошек и др.) Больных животных предварительно лечат, а лишь затем подвергают иммунизации.
2.3. Вакцину рекомендовано вводить внутримышечно, двукратно, с интервалом 10-14 дней сначала в одну, а затем в другую конечность. Место инъекции перед иммунизацией дезинфицируют 70% спиртом, а после йодом. Для каждого животного используется стерильный шприц со стерильной иглой. При исчезновении у животного клинических признаков заболевания в течение 8-13 суток после 1 иммунизации, проводить вторую не обязательно.
2.4. Животных рекомендуется иммунизировать в следующих дозах:
Животные Профилактическая Лечебная

Кошкам:
в возрасте от 1,5 до 6 мес. 0,3-0,5 0,5-1,0
старше 6 мес. 1,0 2,0
Собакам:
в возрасте от 1,5 до 6 мес. 0,5 1,0
старше 6 мес. 1,0 1,0
собакам, с массой тела
свыше 20 кг 1,0 2,0
Кроликам:
в возрасте от 1,5 до 3 мес. 0,5 1,0
старше 3 мес. 1,0 2,0
Лисицы, песцы:
щенкам от 1 до 4 мес. 0,5 1,0
молодняку старше 4 мес.
и взрослым животным 1,0 2,0
Нутрии с 2 мес. возраста 0,5 1,0

2.5. При содержании нутрий при температуре окружающей среды +10 и ниже на месте введения вакцины возможно появление отечности и образование уплотнении.
2.6. В случае иммунизации животных, находящихся в инкубационном периоде, вакцинация способствует нарастанию клинических признаков микоза в местах локализации возбудителя (на коже животного появляются множественные и единичные очаги). Таким животным необходимо ввести лечебную дозу вакцины через 10-14 дней.
2.7. Применения вакцины с профилактической целью не вызывает заболевания дерматофитозами у здоровых животных.
2.8. У собак (особенно у гладкошерстных), после вакцинации на месте введения может возникнуть местная реакция в виде ограниченного болезненного уплотнения. Реакция доброкачественная и исчезает через 3-5 суток. Терапевтического и хирургического вмешательства не требуется. У кошек после вакцинации иногда наблюдается вялость и потеря аппетита.
2.9. Лечебный эффект проявляется спустя 15-20 суток после первой иммунизации и характеризуется разрыхлением, отторжением корок с микотических очагов и ростом нового волоса. Иммунитет у животных, привитых вакциной с профилактической целью, наступает спустя 25-30 суток после второго введения вакцины. Продолжительность иммунитета не менее 12 месяцев.

3. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ

3.1. В случае появления осложнений и неэффективности вакцины "МИКРОДЕРМ" ее применение прекращают и, в соответствии с письмом ГУВ 432-2 от 19.09.87 г. "О порядке предъявления рекламации на ветпрепараты отечественного производства и закупленных по импорту", сообщают об этом Всероссийскому государственному научно-исследовательскому институту контроля, стандартизации и сертификации ветпрепаратов и предприятию-изготовителю. Одновременно в адрес института высылают не менее 3 не вскрытых флаконов с вакциной из серии, вызывающей осложнение.
3.2. Вакцина с истекшим сроком годности приему для проверки не подлежит. Не принимается также вакцина, доставленная с нарушением указанных в наставлении по ее применению условий хранения.