

# Мазь «Левомеколь-Вет»

**Состав:** содержит в 100 г: левомицетин – 0,75 г, метилурацил – 4,0 г, вспомогательные вещества.

**Показания к применению:** для местного лечения гнойных ран, инфицированных, в том числе смешанной микрофлорой (включая стафилококки, синегнойную и кишечную палочки), в первой фазе раневого процесса (гнойно-некротической).

**Описание:**

Однородная сметанообразная масса белого или белого с желтым оттенком цвета.

**Состав:**

Левомицетин, метилурацил, вспомогательные вещества.

**Фармакологические свойства:**

Левомицетин эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: стафилококков, стрептококков, диплококков, сальмонелл, пастерелл, эшерихий, протей. Активен против грамотрицательных анаэробов. Действует на штаммы бактерий, резистентные к пенициллину, стрептомицину, тетрациклам, сульфаниламидам. Слабо активен в отношении кислотоустойчивых бактерий, клостридий и простейших. Метилурацил обладает анаболической и антикатаболической активностью, оказывает гемопоэтическое, лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию, стимулирует эритро- и лейкопоэз, клеточные и гуморальные факторы иммунитета.

**Показания к применению:**

Для местного лечения гнойных ран, инфицированных, в том числе смешанной микрофлорой (включая стафилококки, синегнойную и кишечную палочки), в первой фазе раневого процесса (гнойно-некротической).

**Способ применения и дозы:**

Препарат наносят тонким равномерным слоем на всю пораженную поверхность кожи ежедневно 1-2 раза в сутки до выздоровления, но не более 10 дней.

Длительность лечения зависит от тяжести и течения заболевания. Для введения мази в гнойные полости ею пропитывают марлевые салфетки и рыхло заполняют ими рану или, предварительно подогрев мазь до 35-36 °С, вводят ее через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца.

**Противопоказания:**

Индивидуальная повышенная чувствительность к левомицетину и метилурацилу. Применение мази «Левомеколь-вет» исключает использование других лекарственных препаратов наружного применения аналогичного назначения.

**Ограничения:**

Отсутствуют.

**Форма выпуска:**

Тубы 100 г, 250 г, банка 400 г