ЭЛЕОВИТ

Инструкция по применению витаминно-минерального препарата для профилактики и лечения гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных (Организация-разработчик: ООО «НПК «Асконт+», Московская область)

- *Профилактический комплекс для массовой диспансеризации*
- *Водно-мицеллярная форма раствора*
- *Более 15 лет на рынке — проверенный результат*

ЭЛЕОВИТ — современный иммуностимулирующий витаминный комплекс. Применяется для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, ксерофтальмии, рахита, остеомаляции, тетании, энцефаломаляции, токсической дистрофии печени, дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалений, слизистых оболочек у млекопитающих животных, а также для повышения их плодовитости и жизнеспособности молодняка.

Состав (в 1 мл содержится):

- Ретинол (10 000 МЕ)
- Холекальциферол (2 000 МЕ)
- Токоферол (10 мг)
- Викасол (1 мг)
- Тиамин (10 мг)
- Рибофлавин (4 мг)
- Никотинамид, РР (30 мг)
- Пантотеновая кислота (20 мг)
- Пиридоксин (3 мг)
- Цианокобаламин (10 мкг)
- Фолиевая кислота (0,2 мг)
- Биотин (10 мкг)
- Аминокислоты

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Элеовит (Eleovit). Международное непатентованное наименование: витамины А, Д3, Е, К3, В1, В2, В6, цианокобаламин, биотин, никотинамид, пантотеновая кислота, фолиевая кислота.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций. Элеовит в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: витамин А – 10000 МЕ, витамин Д3 – 2000 МЕ, витамин Е –10 мг, витамин К3 – 1 мг, витамин В1 – 10 мг, витамин В2 – 4 мг, витамин В6 – 3 мг, цианокобаламин –10 мкг, биотин – 10 мкг, никотинамид – 30 мг, пантотеновую кислоту – 20 мг, фолиевую кислоту – 0,2 мг и вспомогательные вещества: гидролизат белка лактоальбумина – 0,2 мг, глюкозу – 50 мг, воду для инъекции – до 1 мл. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую жидкость (допускается опалесценция) от светло-желтого до светло-коричневого цвета со специфическим запахом. Максимально допустимые отклонения содержания витаминов не превышают 15%, по содержанию вспомогательных веществ – 10% от указанных количеств.

3. Выпускают лекарственный препарат в виде стерильного раствора по 5, 10, 20, 50 и 100 мл в темных стеклянных флаконах, соответствующей вместимости, герметично закрытых резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая упаковка снабжена инструкцией по применению.

4. Хранят Элеовит в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5 °С до 25 °С. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

5. Элеовит следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: комбинированный витаминный препарат. Поливитамины. Входящие в состав Элеовита поливитамины оказывают синергидное действие. Витамин А регулирует функцию и регенерацию эпителиальных тканей, тем самым повышая защитную функцию организма животных. Витамин Д участвует в обмене кальция и фосфора, обладает противорахитическим действием. Витамин Е, являясь сильным антиоксидантом, регулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает действие витаминов А и Д. Витамины группы В играют важную роль в нормализации обмена веществ, регуляции нервных процессов. По степени воздействия на организм Элеовит относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

8. Элеовит применяют с лечебной и профилактической целью сельскохозяйственным животным при гиповитаминозах и заболеваниях, развивающихся на их фоне (ксерофтальмии, рахите, остеомаляции, тетании), для повышения воспроизводительных функций, а также как вспомогательное средство при лечении дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалениях слизистых оболочек.

9. Противопоказанием к применению Элеовита является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Элеовит вводят животным внутримышечно в область бедра или шеи, смещая кожу в месте укола в сторону во избежание вытекания раствора. В зимнее время перед применением лекарственное средство следует подогреть на водяной бане до комнатной температуры. С профилактической целью (при стрессах, в период интенсивных нагрузок, высокой продуктивности, беременным животным, при нарушениях воспроизводительной функции, отставании молодняка в росте и развитии, в период вакцинации, дегельминтизации, выздоровлений после перенесенных заболеваний) Элеовит вводят один раз в 2-3 недели. С лечебной целью лекарственный препарат вводят один раз в 7-15 дней. Супоросным свиноматкам Элеовит вводят за 1,5-2,0 месяца до опороса.

Вид животного	***Возрастная и технологическая группа***	***Количество мл на голову в сутки***
Крупный рогатый скот	Взрослое поголовье	5-6
	Молодняк (с 6 до 12 месячного возраста)	2-3
Лошади	Взрослое поголовье	3-5

	Молодняк (с 6 до 12 месячного возраста)	2-3
Свиньи	Взрослое поголовье	2
	Поросята-отъемыши	1,5
	Поросята-сосуны	1
	Новорожденные поросята	0,5
Овцы, козы	Взрослое поголовье	1-2
	Ягнята, козлята	1

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.

12. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В месте инъекции препарата может наблюдаться изменение окраски кожи, самопроизвольно исчезающее в течение 10-14 дней. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков аллергии, применение Элеовита прекращают и животному

назначают антигистаминные лекарственные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Элеовит совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.

16. Продукцию от животных после применения Элеовита можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Элеовитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Элеовитом. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).