



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Ферранимала-75 для профилактики и лечения
железодефицитной анемии у сельскохозяйственных животных
(Организация-разработчик - ООО Фирма «А-БИО», г. Москва)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ферранимал-75 (Ferranimalum-75).
Международное непатентованное название: Железодекстран.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Ферранимал-75 содержит в 1 мл в качестве действующего вещества - комплексное соединение низкомолекулярного декстрана с железом (III) (элементарного железа 75 мг) и воду для инъекций до 1 мл в качестве вспомогательного вещества.
По внешнему виду Ферранимал-75 представляет собой непрозрачную жидкость красно-бурого цвета без осадка. Хорошо смешивается с водой.
3. Выпускают Ферранимал-75 расфасованным по 10, 20, 50, 100, 200 и 500 мл в стеклянные или полимерные флаконы, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
Каждый флакон снабжают Инструкцией по применению.
4. Ферранимал-75 хранят в заводской упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 3°C до 30°C. Срок годности при соблюдении условий хранения - 3 года со дня изготовления. Запрещается использовать Ферранимал-75 по истечении срока годности.
5. Ферранимал-75 необходимо хранить в недоступном для детей месте.
6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Ферранимал-75 относится к группе противоанемических препаратов, стимуляторов гемопоэза.

Ферранимал-75 при внутримышечном введении всасывается и депонируется в печени и кроветворных органах, таким образом, восполняя дефицит железа в организме. Ферранимал-75 стимулирует эритропоэз и синтез гемоглобина, нормализует обменные процессы, ускоряет рост, повышает устойчивость организма к различным заболеваниям, улучшает общее состояние.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Ферранимал-75 применяют для профилактики и лечения железодефицитной анемии сельскохозяйственных животных.
9. Назначение Ферранимала-75 животным противопоказано при гиповитаминозе по витамину Е.
10. Ферранимал-75 вводят внутримышечно в область бедра или шеи свиноматкам и пороссятам и в область бедра - телятам и ягнятам. В месте укола иглы кожу предварительно смещают в сторону, чтобы препарат не вытекал после инъекции.
В зимнее время перед применением Ферранимал-75 подогревают на водяной бане до 36-38° С.

С профилактической целью Ферранимал-75 вводят животным в следующих дозах:

- поросётам по 2 мл на 2-4-й день жизни. При необходимости инъекцию повторяют через две недели;
- свиноматкам по 10 мл за 15-20 дней до опороса;
- ягнятам по 3-4 мл на 5-6-й день жизни.

С лечебной целью Ферранимал-75 вводят животным в следующих дозах (в мл из расчета на 1 кг массы животного):

- поросётам по 0,66-1,33 мл или 50-100 мг железа на 1 кг массы животного;
- ягнятам по 0,66 мл или 50 мг железа на 1 кг массы животного.

При необходимости инъекцию повторяют через 10 дней в той же дозировке.

11. Симптомы передозировки при применении Ферранимала-75 не выявлены.

12. Особенности действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не выявлено.

13. В месте введения Ферранимала-75 происходит временное изменение окраски тканей.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Ферранимала-75 в соответствии с настоящей инструкцией не установлено, за исключением индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

15. Применение Ферранимала-75 не исключает применения других лекарственных средств.

16. Мясо и молоко во время и после применения Ферранимала-75 используют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с Ферранималом-75 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

18. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и случайном проглатывании лекарственного препарата следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Флаконы из-под Ферранимала-75 запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации в соответствии с требованиями законодательства.

20. Организация-производитель: ООО Фирма «А-БИО», 121019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 9/12, стр. 1

Адрес места производства: 142290, Московская область, г. Пущино, проспект Науки, д. 5.

Инструкция по применению разработана: ООО Фирма «А-БИО» (121019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 9/12, стр. 1)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

В связи с утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению Ферранимала-75 для профилактики и лечения железодефицитной анемии у сельскохозяйственных животных, утвержденная Россельхознадзором 03.04.2006 г.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-36.12-1196№ПВР-3-3.5/01490